

Dr. Hanna Baumann
 Prof. Luigi Raio
 Universitätsklinik für Frauenheilkunde
 Inselspital Bern

Wo ist die Lebervene?

Eine 38-jährige Zweitgravida wird uns in der 26. Woche zugewiesen wegen V.a. Dextrokardie. Es besteht ein Zustand nach sekundärer Sektio bei Geburtsstillstand sechs Jahre zuvor. Das Herz ist anatomisch und funktionell wenig auffällig. Es liegt keine Dextrokardie vor, sondern eher eine Mesokardie. Die

eigentliche Auffälligkeit kann im Querschnitt des Abdomens (Abb. 1) und in den Videoaufnahmen (QRC 1: Abdomen quer; QRC 2: Abdomen sagittal) vermutet werden. Etwas, das eigentlich immer dargestellt werden kann, ist nicht so, wie es sollte! Haben Sie eine Idee?




Abbildung 1. (A) Abdomen quer Höhe Magen; (B) mit Farbdoppler; (C) Querschnitt kurz vor dem 4-Kammerblick bzw. rechten Vorhof. (Aufgenommen mit einer RM7C XDclear™-4D-Konvex-Matrix-Sonde für GE Voluson Expert 22)



QRC 1: Abdomen quer



QRC 2: Abdomen sagittal



GE HealthCare

Mit Unterstützung von
 GE